


چگونه از کم شنوایی

جلوگیری کنیم؟



پویش ملی آگاه سازی جامعه به کم شنوایی
راهنمای مختصر در مورد عفونت گوش کودکان

چگونه درمان را پیگیری کنیم؟

- بعد از 1 تا 2 هفته دوباره به درمانگاه بروید.



- پزشک برای این که مطمئن شود عفونت گوش
معالجه شده است، دوباره گوش فرزندتان را نگاه
می کند.



- اگر عفونت درمان نشده باشد، پزشک شما را به پزشک
فوق تخصص یا بیمارستان ارجاع می دهد.



به خاطر داشته باشید:

اگر کودکان به مدت طولانی عفونت گوش داشته
باشد و درمان نشود، دچار کم شنوایی دائمی می
شود.

چگونه قطره گوش بریزیم؟

ممکن است برای فرزند شما قطره گوش تجویز شود. طریقه
درست استفاده از قطره گوش عبارت است از:



- گوش کودک را با پارچه نخی تمیز نمایید.
- در حالی که سر کودک را به یک طرف نگه داشته
اید، قطره را داخل گوش کودک بریزید.



- گوش را فشار
دهید تا
کمک کنید
قطره به درستی
حرکت کند.
- دستورالعمل را رعایت کنید، این که چند بار در روز و
به مدت چند روز قطره بریزید مهم است.

